

La tuberculose endobronchique

Z.LAKLAAI, H. BENJELLOUN, N. ZAGHBA, N. YASSINE

Service des maladies respiratoires du CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction

- La tuberculose est un problème majeur de santé publique au Maroc.
- La tuberculose endobronchique est une localisation peu fréquente de la tuberculose, de manifestations souvent trompeuses.


Matériels et méthodes

- Etude
- Service des maladies respiratoires de l'hôpital Ibn Rochd de Casablanca
- Patients: 35 cas.
- Période: Janvier 2009 à Aout 2021.
- But : Décrire les aspects cliniques et diagnostiques de la tuberculose endobronchique.

Résultat

Données épidémiologiques des patients

- Sexe :
 - homme 45,71%
 - femme 54,29%
- Moyenne d'âge : 46,5 ans
- Délai moyen de diagnostic : 2,9 mois
- Comorbidités : dominées par le diabète (14,28%)
- Symptômes cliniques:



Imagerie



Foyer de condensation basal droit

Opacité inhomogène basal

La radiographie thoracique montrait des lésions pulmonaires associées dans 28 cas

Bronchoscopi

Aspect endoscopique	Nombre de cas
Épaississements des éperons	5 cas
Granulations blanchâtres endobronchiques	16 cas
Bourgeons d'allure tumoral	9 cas
Fistule ganglio bronchique	2 cas



Moyens de confirmations:

Moyens	Nombre de cas	Pourcentage
Biopsies bronchiques	29	82,85%
Liquide d'aspiration	6	17%
Bacilloscopie dans les expectorations	19	54%
Expectorations post bronchique	8	22%

Traitement

Tous les patients étaient mis sous traitement antituberculeux avec une bonne évolution clinique et

Conclusion

Cette étude montre le polymorphisme clinique, radiologique et endoscopique de la tuberculose bronchique rendant son diagnostic difficile et l'importance d'une confirmation bactériologique et/ou histologique. .