

# Particularités cliniques,radiologiques,histologiques et évolutives du carcinome bronchogénique chez la femme



S. Chikhani, N. Zaghba, H. Benjelloun, K. Chaanoun, H. Harraz, N. Yassine

Service des Maladies Respiratoires – CHU Ibn Rochd

## Introduction

Le cancer bronchique primitif chez la femme représente le troisième cancer par sa fréquence, l'incidence et La mortalité de ce cancer est toujours en augmentation. Il se caractérise chez la femme par de nombreuses spécificités résultant de facteurs environnementaux, génétiques et hormonaux, à côté du rôle déterminant du tabagisme qui est en nette augmentation dans la population féminine.

## Matériels et méthodes

- But : souligner les particularités cliniques, radiologiques, histologiques et évolutives du carcinome bronchogénique chez la femme.
- Etude rétrospective entre 2019 et 2022.
- 64 cas de carcinome bronchogénique chez des femmes colligés au service des maladies respiratoires du CHU Ibn Rochd

## Résultats

### Epidémiologie

- L'origine rural: 80%
- Tabagisme : 31% des cas
- l'exposition à la fumée de bois : 67% des cas.
- Moyenne d'âge : 60 ans.

### Clinique

Signes cliniques	Pourcentage %
Douleur thoracique	84%
Dyspnée	79%
Syndrome d'épanchement liquidien	40%
Adénopathies périphériques	6%
Normal	54%

### Type histologique :



### TDM thoracique :

- processus tissulaire d'allure tumorale : 95 % des cas,
- Adénopathies médiastinales : 56 % des cas,
- Pleurésie : 34 %

### Prise en charge et évolution :

- Traitements palliatifs : 46 patientes.
- Chimioradiothérapie: 10 patientes.
- Six sont décédées.
- Un traitement chirurgical et une immunothérapie: deux patientes .

## Conclusion

À travers cette étude, nous insistons sur la fréquence élevée de l'exposition à la fumée de bois comme principal facteur carcinogène chez la femme et sur l'adénocarcinome comme principal type histologique.