

### Introduction

- La tuberculose multifocale est définie par l'atteinte de deux sites extra-pulmonaires non contigus associée ou non à une atteinte pulmonaire.
- Forme rare.
- Elle survient le plus souvent chez les patients immunodéprimés surtout ceux atteints du VIH.
- Toutefois, cette forme de tuberculose peut intéresser même les sujets immunocompétents.

### Matériels et méthodes

- Étude rétrospective à visée descriptive.
- 95 cas de patients immunocompétents suivis pour une tuberculose multifocale.
- service des maladies respiratoires du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
- Période : entre 2001 et 2023.

### Résultats

#### ➤ Données épidémiologiques des patients

- Sexe :



- Moyenne d'âge : 33 ans.
- Extrêmes : 17 et 72 ans.

#### ➤ Antécédents :


Antécédent	Nombre de cas	%
Vaccination par le BCG	95	100
Contage tuberculeux récent	35	37
Tuberculose pulmonaire	0	0

#### ➤ Symptomatologie clinique :


- Délai moyen entre le début des symptômes et la première consultation : 68 jours ( extrêmes entre 2 semaines et 4 mois).
- Fièvre et altération de l'état général : tous les cas.

#### ➤ Tuberculose pulmonaire:

- Retrouvée chez tous les patients :



#### ➤ Tuberculose extra pulmonaire :



#### ➤ Imagerie thoracique et cérébrale :



Miliaire, péricardite tuberculeuse et tuberculomes cérébraux

#### ➤ Traitement :

- Patients étaient traités selon les recommandations du programme national de lutte contre la tuberculose au Maroc (PNLT).
- Polychimiothérapie anti-tuberculeuse selon le régime :
  - 2SRHZ/7RH : 36 cas.
  - 2RHZE/7RH : 59 cas.
- Corticothérapie orale : 4 à 6 semaines, si atteinte :
  - Neuro-méningée
  - Péricardique
  - Miliaire tuberculeuse hypoxémiant

#### ➤ Evolution :

- Favorable : 75 cas.
- Rechute tuberculeuse : 1 cas
- Décès : 2 cas
- Perdus de vu : 17 cas

### Conclusion

- À travers notre étude nous soulignons qu'un sujet immunocompétent même sans facteur de risque ou terrain d'immunodéficient n'est pas à l'abri des formes graves et multifocales de la tuberculose .
- Le pronostic reste relativement bon sous réserve d'un traitement antituberculeux précoce et prolongé.