

Localisation pleurale des hémopathies malignes

I.EL HAMDANI, H.HARRAZ K.
CHANNOUN, H.BENJELLOUN, N.ZAGHBA,
N. YASSINE

Service des maladies respiratoires du CHU Ibn



Introduction

-La localisation pleurale au cours des hémopathies malignes reste peu fréquente et varie en fonction des différents types histologiques des hémopathies.

Matériels et méthodes

-Nous rapportons 18 observations colligées au service de maladies respiratoires du CHU IBN ROCHD Casablanca.

Résultats


Données épidémiologiques

- Nette prédominance masculine: 14 cas.
- Moyenne d'âge: 46 ans


Symptomatologie clinique:

| | Nombre de cas |
|------------------------------|---------------|
| Dyspnée | 18 |
| Douleur thoracique | 10 |
| Altération de l'état général | 18 |


L'imagerie thoracique:



Type histologique:



Examen clinique:



Ponction pleurale exploratrice :

- Liquide séro-hématique: 12 cas
- Liquide jaune citrin: 6 cas
- Étude cytologique du liquide pleural: présence de blastes dans 3 cas.

Ponction biopsie pleurale:

- A permis de confirmer le diagnostic dans 13 cas

Traitements:

-Chimiothérapie a été indiquée chez tous nos patients.

Evolution:

| | Cas |
|---------------------|-----|
| Évolution favorable | 8 |
| Rechute | 1 |
| Perdus de vue | 6 |
| Décès | 3 |

Conclusion

- À la lumière de ce travail nous rappelons la rareté de la localisation pleurale des hémopathies malignes.