

L'atteinte ostéo-médullaire au cours de la miliaire tuberculeuse

I.EL HAMDANI, H.HARRAZ K. CHANOUN, N. ZAGHBA, H.

BENJELLOUN, N. YASSINE

Service des maladies respiratoires du CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction

- La localisation médullaire de la tuberculose est rare.
- Elle survient le plus souvent dans un contexte d'une tuberculose multifocale.

Matériels et méthodes

-Etude rétrospective portant sur 55 cas de miliaire tuberculeuse ayant tous bénéficié d'une biopsie ostéomédullaire (BOM).

-Colligés au service de maladies respiratoires du CHU IBN ROCHD Casablanca.

Résultats

Données épidémiologiques

- Nette prédominance féminine: 32 cas.
- Moyenne d'âge: 34 ans

Antécédents:

| Antécédents | Nombre de cas |
|------------------------|---------------|
| Tuberculose pulmonaire | 8 |
| Contage tuberculeux | 5 |
| Diabète | 3 |
| VIH | 2 |

Symptomatologie clinique:


- Altération de l'état générale: tous les cas
- Fièvre: 39 cas

L'imagerie thoracique:

- Aspect de miliaire dans tous les cas.



Biopsie ostéo-médullaire:



Le bilan de dissémination:

41 %
Atteinte hématologique

11 %
Autre

8 %
Autre

16 %
Autre

24 %
Autre

Autre