

Introduction

Le diabète constitue un terrain de prédisposition pour la tuberculose, surtout s'il est déséquilibré. Les personnes diabétiques ont 2,5 fois plus de risque de développer la tuberculose et l'incidence de l'association tuberculose-diabète varie entre 2,6 et 14,7 %.

Matériels et méthodes

L'objectif de notre travail est d'étudier les particularités cliniques, radiologique et évolutives de la tuberculose chez les diabétiques. Nous rapportons une étude rétrospective portant sur 85 cas, colligés au centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires Casa-Anfa entre 2005 et 2023.

■ Données épidémiologiques :

- Prédominance féminine à 54%
- Moyenne d'âge: 47 ans


■ Antécédent:

Antécédent	Nombre de cas	Pourcentage
Tabagisme	10	11%
HTA	21	25%
Cardiopathie	18	21%


■ Symptomatologie clinique :

Symptômes	Nombre de cas	Pourcentage
Toux	85	100%
Hémoptysies	25	29%
douleurs thoraciques	14	16%


■ Radiographie thoracique :



■ Baciloscopy :



■ Evolution:



Conclusion

La tuberculose chez le diabétique constitue une forme particulière nécessitant un diagnostic et un traitement précoce avec ajustement du métabolisme glucidique.