

Les images hydro-aériques

Profil étiologique

Z. BENMERZOUQ, N. ZAGHBA, H. BENJELLOUN, K. CHAANOUN, N. YASSINE
Service des maladies respiratoires du CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction

Les images hydro-aériques (IHA) est un motif fréquent d'hospitalisation dans un service de pneumologie qui pose un problème de diagnostic étiologique

Matériels et méthodes

- Étude rétrospective.
- 129 cas colligés au service des maladies respiratoires du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
- Période : entre 2014 et 2023

Résultats

Données épidémiologiques

- Prédominance masculine : 82% des cas.
- Moyenne d'âge : 47 ans (17 – 89 ans).

Antécédents

Antécédent	%
Tabagisme	67%
Tuberculose	10%
Diabète	9%


Symptomatologie clinique

- Syndrome bronchique: 87%.
- Douleur thoracique : 52%.
- Hydatidoptysie : 21%.
- Hémoptysie : 15%.


Siège des lésions

- Pleural : 52%.
- Parenchymateux : 41%.
- Diaphragmatique : 7%.

Imagerie thoracique



Diagnostic étiologique



Traitement :

- Bi-antibiothérapie : 35%
- Drainage thoracique : 30%
- Traitement anti-bacillaire : 20%
- Chirurgie : 27%
- Soins palliatifs : 8%
- Kinésithérapie : 100%

EVOLUTION :

- L'évolution était bonne dans 89% des cas.
- On déplore 11 décès.

Conclusion

Les étiologies des IHA sont très variées, dominées dans notre contexte par les Pyo-pneumothorax tuberculeux, les kystes hydatiques et les abcès pulmonaires.