



Prévalence de la conjonctivite allergique chez les patients asthmatiques

N. Yousfi, N. Zaghba, H. Harraz, W. Jalloul, K. Chaanoun, H. Benjelloun, N. Yassine

Service des Maladies Respiratoires – CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction

La conjonctivite allergique est une pathologie de plus en plus fréquente, souvent associée à la rhinite allergique. Les liens entre asthme et rhinite allergique semblent également être particulièrement étroits.

BUT


Evaluer le profil de la conjonctivite allergique et sa fréquence chez les patients asthmatiques suivis en consultation

Matériel et méthodes

- Etude rétrospective
- portant sur 390 patients asthmatiques suivis en consultation d'allergologie au service de du CHU Ibn-Rochd de Casablanca entre janvier 2010 et janvier 2024.


L'évolution

était favorable sous traitement antihistaminique systémique dans 83 % des cas, le recours à un traitement local par collyres antihistaminiques était nécessaire dans 17 % des cas.



Résultats

- Nombre total des patients avec une conjonctivite : 73 % des consultants
- Moyenne d'âge : 32 ans, début de symptômes à l'âge de 22 ans.
- Prédominance féminine : 79 %
- L'atopie familiale était retrouvée dans 28 % des cas



Conclusion

Le traitement de la conjonctivite allergique constitue une pierre angulaire dans la prise en charge des patients allergique en consultation d'allergologie afin d'améliorer leur qualité de vie.