

## Connaissances des risques liés au tabagisme chez des patients hospitalisés pour BPCO au service de pneumologie du CHU Med VI de Marrakech

S.Dakir, K. Mouatassim, S.Keddabi,M.Ijim,O.Fikri,L.Amro

Service de pneumologie. Hôpital Arrazi, CHU Mohamed VI, Labo, LRMS. FMPM. UCA, Marrakech, Maroc

### INTRODUCTION

Le tabagisme est un véritable fléau des temps modernes, il constitue un véritable problème de santé majeur et mondial.

### BUT DU TRAVAIL

Etudier les connaissances des risques liés au tabagisme chez des patients hospitalisés au service de pneumologie du CHU Med VI de Marrakech.

### MATERIEL ET METHODES


Il s'agit d'une étude transversale incluant les patients atteints de BPCO hospitalisés au service de pneumologie au CHU Mohamed VI de Marrakech entre mai 2024 jusqu'à aout 2024.

### RESULTATS

Nous avons colligés 57 patients. La moyenne d'âge des patients était de 52 ans avec une nette prédominance masculine 92 %. Un analphabétisme a été noté chez 21 % des cas.

Le tabagisme était plus répandu en milieu rural chez les hommes ayant le plus faible niveau d'études et appartenant aux classes sociales défavorisées.

L'âge de début du tabagisme était en moyenne de 16 ans, avec des extrêmes allant de 14 à 21ans. Quant au coût mensuel du tabagisme, il était estimé entre 2 et 45 % du Salaire.



De façon concomitante, 29 % des sujets s'adonnaient à la prise de boissons alcoolisées ,15 % consommaient du cannabis et 20% consommaient du Kiff. La quasi-totalité des patients (90 %) pensaient que le tabagisme induisait une maladie, la maladie la plus redoutée était le cancer (68%), Cependant 10 % des patients niaient son implication dans une pathologie quelconque. La consommation de tabac sous forme de cigarette, était estimée en moyenne à 25 paquets-année.

Les effets secondaires du tabac étaient représentés principalement par la toux chronique (63% des cas). La dépendance à la nicotine était moyenne chez 32 malades (47,8 %) selon le test de Fagerström.

### CONCLUSION

Le tabac est une cause très importante de morbidité et de mortalité dans la population marocaine. Il est donc essentiel de surveiller l'évolution de sa consommation et d'en mesurer les conséquences sur la santé.