

Introduction

- La tuberculose est un problème majeur de santé publique au Maroc.
- La tuberculose endobronchique est une localisation peu fréquente de la tuberculose, de manifestations souvent trompeuses.
- Elle présente un polymorphisme radio-clinique et endoscopique très important et prête confusion avec une néoplasie bronchique.


Matériels et méthodes

- Étude rétrospective.
- Patients: 36 cas.
- Service des maladies respiratoires de l'hôpital Ibn Rochd de Casablanca
- Période: Janvier 2012 à Aout 2024.

Résultats


➤ Données épidémiologiques:

- Sexe :




- Moyenne d'âge : 48 ans.
- Délai moyen de diagnostic : 3 mois et demi.

➤ Symptômes cliniques:



➤ Imagerie thoracique:



➤ Bronchoscopie

Aspect endoscopique	Nombre de cas	%
Épaississements des éperons	3	9
Granulations blanchâtres endobronchiques	18	50
Bourgeons d'allure tumoral	10	28
Fistule ganglio bronchique	2	6



➤ Moyens de confirmation:

Moyens	Nombre de cas	%
Biopsies bronchiques	29	81%
Liquide d'aspirations bronchique	6	17%
Baciloscopie dans les expectorations	18	53%

➤ Traitement:

- Traitement antibacillaire: 36 cas.
- Corticothérapie orale: 8 cas.

➤ Evolution:

- Bonne: 34 cas.
- Décès: 2 cas.

Conclusion

Cette étude montre le polymorphisme clinique, radiologique et endoscopique de la tuberculose bronchique rendant son diagnostic difficile et l'importance d'une confirmation bactériologique et/ou histologique.