

## 1. Introduction

- Le cancer bronchogénique est un cancer fréquent chez les femmes, troisième en termes d'incidence.
- Les principaux facteurs de risque sont le tabagisme et l'exposition à la fumée de bois.
- Nécessité d'une meilleure compréhension des facteurs de risque et des stratégies de traitement adaptées.

## 2. Objectifs

- Analyser les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des patientes atteintes de cancer bronchogénique.
- Mettre en évidence les facteurs de risque, en particulier l'exposition à la fumée de bois.

## 3. Méthodes


- Type d'étude : Rétrospective
- Période : 2019 - 2024
- Lieu : Service des maladies respiratoires, CHU Ibn Rochd.
- Population : 100 patientes présentant un carcinome bronchogénique.

## 4. Résultats

### • Caractéristiques des Patientes


- Âge moyen : 66 ans (32-88 ans)
- Milieu rural : 72%
- Exposition à la fumée de bois : 61%.
- Antécédents de tabagisme : 39% (Actif : 23%, Passif : 16%).

### Symptômes les plus fréquents :




## 4. Résultats

### • Aspect radiologique



### • Aspect endoscopique



### • Moyens de confirmation :

- Biopsie bronchique : 58%
- Biopsie pleurale : 21%
- Autres (mediastinoscopie, thoracoscopie) : 21%

### • Types histologiques :

- Adénocarcinome pulmonaire : 62%
- Carcinome épidermoïde : 22%
- Carcinome neuroendocrine : 16%

### • Traitement et Suivi

- Traitement Palliatif : 63 patientes
- Chimioradiothérapie : 21 patientes
- Chirurgie : 3 patientes
- Immunothérapie : 2 patientes

## 5. Conclusion

- L'exposition à la fumée de bois est un facteur carcinogène important.
- Le diagnostic précoce et des stratégies de traitement ciblées sont essentiels.
- La prévention, notamment dans les zones rurales, est primordiale.