



Particularités de la BPCO chez la femme

W.Bouddine, K.Chaanoun, H.Harraz, W.Jalloul, Z.Laklaai, H.Benjelloun, N.Zaghba
Service des maladies respiratoires du CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc



Introduction

La BPCO chez la femme est liée à une atteinte plus précoce et plus sévère de la maladie.

Notre but est d'évaluer le profil épidémiologique, clinique et évolutif de la BPCO chez la femme.

Matériels et méthodes

Etude rétrospective et comparative entre un groupe de femmes porteuses de BPCO et un groupe d'hommes témoins connu BPCO suivis à la consultation du service de pneumologie du CHU Ibn rochd de Casablanca entre janvier 2020 et décembre 2025.

Résultats

- 40 cas répartis en un groupe homme : 20 cas et un groupe femme : 20 cas
- Moyenne d'âge : 56 ans dans le groupe homme et 58 ans dans le groupe femme


Antécédents	Femmes	Hommes
Tabagisme	5% (16 paquet-année)	100% (35 paquet-année)
Fumée de bois	95%	0%

Signe révélateur principal :

- Toux : Groupe homme 55 % des cas
- Dyspnée: Groupe femme 90 % des cas

Spirométrie

Sévérité de la BPCO



Conclusion

La BPCO est un problème de santé public dans notre pays et dans le monde dont les causes chez la femme sont dominées dans notre contexte par l'exposition à la fumée de bois.