

Introduction

- La miliaire tuberculeuse est une forme grave et rare de la tuberculose.
- C'est une dissémination le plus souvent hématogène du bacille de Koch.
- Elles représentent moins de 2% des tuberculoses.

Matériels et méthodes

- But: Mettre l'accent sur la gravité de cette forme de tuberculose.
- Etude rétrospective portant sur 50 cas de miliaires tuberculeuses colligés au service des maladies respiratoires du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre janvier 2019 à juin 2025.

Epidémiologie

- La moyenne d'âge: 32 ans
- Prédominance masculine: 48%

Diagnostic

| Antécédents | Nombre de cas | Pourcentage |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Antécédent de tuberculose | 12 | 24% |
| Contage tuberculeux récent | 16 | 32% |
| Signes cliniques | Nombre de cas | Pourcentage |
| Altération de l'état général | 50 | 100% |
| Fièvre | 40 | 80% |

Résultats


| Radiographie thoracique | Nombre de cas | Pourcentage |
|-------------------------|---------------|-------------|
| Aspect de miliaire | 50 | 100% |
| Cardiomégalie | 3 | 6% |
| Pneumothorax | 2 | 4% |
| Opacités excavées | 6 | 12% |

| Bilan dans les expectorations | Nombre de cas | Pourcentage |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| GeneXpert | 25 | 50% |
| BK | 15 | 30% |

Nombre de cas selon le bilan du terrain

| | |
|---------------------|---|
| Sérologie HIV + | 3 |
| Diabète | 3 |
| Insuffisance rénale | 1 |

Bilan de dissémination



Traitements

2 RHZE/ 7 RH

Evolution

- 52% bonne évolution
- 12% perdus de vues
- 12% décédés

Conclusion

Nous insistons à travers ce travail sur la gravité de la miliaire tuberculeuse et la nécessité d'une prise en charge thérapeutique précoce et urgente.